

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №3 города Кузнецка**

# **Изопериметрическая задача Дидоны**

**Исследовательская работа по математике**

**Выполнил:**

**Ученик 8б класса**

**Шалимов Николай**

**Руководитель: Сергеева**

**Елена Владимировна-учитель**

**математики**

**Кузнецк, 2020-2021**

## Оглавление

1. Введение.....	3
2. Немного истории .....	5
3. Миф о Дидоне и метод Якоба Штейнера.....	6
4. Мои исследования и эксперименты.....	6
5. Применение изопериметрической задачи на практике.....	10
6. Изопериметрическая задача в пространстве.....	13
7. Заключение.....	13
8. Литература и интернет-ресурсы.....	15

## 1. Введение

В римской мифологии есть легенда о Дидоне.

Согласно этой легенде, Дидона была дочерью царя Тира и женой жреца Геракла Акербаса. После того как брат Дидоны Пигмалион убил ее мужа, позарившись на его богатства, Дидона была вынуждена бежать. Захватив с собой часть сокровищ мужа, она в сопровождении многочисленных спутников отправилась на запад вдоль берегов Средиземного моря. Ей приглянулось одно место на побережье нынешнего Тунисского залива. Дидона повела переговоры с берберийским царем Ярбом о продаже земли. По условию она могла взять столько земли, сколько можно «окружить бычьей шкурой». Сделка состоялась. Тогда Дидона разрешила эту шкуру на тонкие ремни, связав их воедино, и окружила изрядный кусок земли. На этом месте была основана цитадель Карфагена Бирса. (По-гречески «бирса» как раз и означает «снятая шкура»)

Так гласит легенда.

Эту историю нам рассказала учитель математики.

**Меня заинтересовал вопрос: какой формы был участок земли, который окружила Дидона чтобы получить наибольшую площадь?**

Ответ на этот вопрос я, конечно же нашел и узнал, что Дидона сделала круг и что задача Дидоны называется изопериметрической задачей. Говоря современным языком, Дидоне надо было найти среди всех фигур с заданным периметром (длиной верёвки) ту, которая имеет большую площадь.

Я решил провести исследование по этой теме.

**Цель работы:** найти историю доказательства того, что среди геометрических фигур с равными периметрами наибольшую площадь имеет круг. Показать применение изопериметрической задачи в повседневной жизни.

**Объект исследования:** изопериметрическая задача Дидоны.

**Предмет исследования:** приемы решений изопериметрической задачи.

**Гипотеза:** среди геометрических фигур с равными периметрами наибольшую площадь имеет круг.

## 2. Немного истории

Попытки строгого доказательства изопериметрических задач предпринимались ещё в древности. Многие выдающиеся мыслители находили различные объяснения максимальной площади круга и шара.

Вот что писал Николай Коперник в своей великой книге «О вращениях небесных сфер»: «Прежде всего, мы должны заметить, что мир является шарообразным или потому, что эта форма совершеннейшая из всех и не нуждается ни в каких скрепах и вся представляет цельность, или потому, что эта форма среди всех других обладает наибольшей вместимостью, что более всего приличествует тому, что должно охватить и сохранить всё». Если шар вмещает в себя весь мир, то он, конечно, имеет максимальный объём!

В книге Пойа Д. «Математика и правдоподобные рассуждения» написано о том, что «уже древнегреческим математикам был известен ответ в изопериметрической задаче: в плоском случае искомая фигура – это круг (а в пространственном – шар). На эту мысль, наводит, во-первых, непосредственное сравнение площадей некоторых фигур равного периметра.

Во-вторых, некоторые физические соображения также показывают, что ответ в изопериметрической задаче – это круг или шар. Например, капельки воды и мыльные пузыри неслучайно имеют форму шара: силы поверхностного натяжения действуют так, чтобы уменьшать площадь поверхности.

В-третьих, древние греки считали круг наиболее совершенной фигурой. Именно такую форму имеют небесные тела и их орбиты. Это соображение увеличивало их уверенность в том, что именно круг, помимо других своих интересных свойств, должен также быть решением изопериметрической задачи.

Но вот геометрически древние греки доказать этого не могли.

Древнегреческий математик Зенодор, живший в II веке до н. э. в Александрии, дал вполне строгое, даже с позиций сегодняшнего дня, обоснование следующего факта: если для данного  $n$  существует  $n$ -угольник периметра 1, имеющий максимальную площадь, то это — правильный  $n$ -угольник.

Зенодор написал целый трактат «Об изопериметрических фигурах». Хотя трактат Зенодора не сохранился, некоторые его результаты дошли до нас в изложении математиков Паппа (III в. н. э.) и Теона (IV в. н. э.), в том числе следующие теоремы:

- из двух треугольников с общей стороной и равными периметрами меньше площадь того, которому принадлежит наибольший из четырех углов, прилежащих к этой стороне (отсюда сразу следует, что из всех треугольников равного периметра, имеющих общее основание, площадь максимальна у равнобедренного треугольника);
- при одинаковом числе сторон и равных периметрах площадь правильного многоугольника больше, чем неправильного;
- из двух правильных многоугольников с равными периметрами больше площадь того, у которого больше сторон



Таким образом, чем «ближе» многоугольник к кругу, тем, действительно, больше его изопериметрическое частное.

### 3. Миф о Дидоне и метод Якоба Штейнера

Теперь возвратимся к нашей легенде. Догадалась ли Дидона, что искомая фигура — круг? Кто знает... Известно лишь, что легендарная царица и на этот раз сумела урвать лишний кусок — она выбрала свой участок на берегу моря, так что вся морская граница досталась ей даром. За этой женщиной придется признать крупный геометрический талант: ведь изопериметрическая задача строго была решена лишь в прошлом веке швейцарским геометром Якобом Штейнером ((1796-1863), а ее «карфагенский вариант» — с учетом того, что часть замкнутой кривой представляет собой прямую линию «побережья», — и того позже.

Задача Штейнера звучит следующим образом: *среди всевозможных плоских замкнутых линий заданной длины найдите ту, которая ограничивает фигуру наибольшей площади.*

Якоб Штейнер доказал, что если фигура наибольшей площади среди всех фигур данного периметра существует, то это — круг. В ходе рассуждений осталось недоказанным одно утверждение, на которое он опирался: что искомая фигура существует. Сам Штейнер этот недостаток доказательства не устранил. Это было сделано позднее другими математиками Ф. Эдлером и Константином Каратеодори.

С изопериметрической задачи по существу начинается одно из важнейших направлений современной математики — вариационное исчисление.

### 4. Мои исследования

Для решения задачи на нахождения фигуры с наибольшей площадью я провел исследование плоских фигур, изучаемых в 8 классе. Для удобства вычислений периметр приму 120 см.

#### 4.1 Исследование площадей треугольников с одним и тем же периметром 120 см.

1) Произвольный треугольник со сторонами 40 см, 55 см, 25 см. Найдем его площадь по формуле Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{60(60-40)(60-55)(60-25)} \\ = \sqrt{60 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 35} = \sqrt{210000} = \sqrt{21 \cdot 10000} = 100\sqrt{21} \approx \mathbf{458} \text{ см}^2, \text{ где } p \\ = \frac{P}{2} - \text{полупериметр.}$$

2) Прямоугольный треугольник со сторонами 30 см, 40 см, 50 см.

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 40 = \mathbf{600} \text{ см}^2.$$


3) Равнобедренный треугольник со сторонами 45 см, 45 см, 30 см.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{60(60-45)(60-45)(60-30)} = \\ \sqrt{60 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 30} = \sqrt{405000} \approx \mathbf{636} \text{ см}^2.$$

4) Равносторонний треугольник со стороной 40 см.


$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{60(60-40)(60-40)(60-40)} = \\ \sqrt{60 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20} = \sqrt{480000} = \sqrt{3 \cdot 16 \cdot 10000} = 400\sqrt{3} \approx \mathbf{693} \text{ см}^2.$$

**Вывод:** из всех треугольников с одинаковым периметром наибольшую площадь имеет равносторонний треугольник.



#### 4.2 Исследование площадей трапеций с одним и тем же периметром равным 120 см.

1) Произвольная трапеция со сторонами 13 см, 20 см,  $a = 33$  см,  $b = 54$  см.



Вспользуемся формулой площади трапеции:  $S = \frac{1}{2}(a+b)h$ . Найдем высоту по теореме

Пифагора:  $h = \sqrt{20^2 - x^2} = \sqrt{13^2 - (21-x)^2}$

$$\sqrt{400 - x^2} = \sqrt{169 - 441 + 42x - x^2}$$

$$-x^2 + x^2 - 42x = 169 - 441 - 400$$


$$-42x = -672$$

$$x = 16$$

$$h = \sqrt{20^2 - 16^2} = \sqrt{400 - 256} = \sqrt{144} = 12$$


Подставляем под формулу:  $S = \frac{1}{2}(33 + 54) \cdot 12 = \mathbf{522} \text{ см}^2$ .

2) Прямоугольная трапеция со сторонами 20 см, 30 см,  $a = 20$  см,  $b = 50$  см.



$$S = \frac{1}{2}(20 + 50) \cdot 20 = 700 \text{ см}^2.$$

3) Равнобедренная трапеция со сторонами 26 см, 26 см, a = 24 см, b = 44 см.



$$h = \sqrt{26^2 - 10^2} = \sqrt{676 - 100} = \sqrt{576} = 24$$

$$S = \frac{1}{2}(24 + 44) \cdot 24 = 816 \text{ см}^2.$$

**Вывод:** из всех трапеций с одним и тем же периметром наибольшую площадь имеет равнобокая трапеции.

#### 4.3 Исследование площадей параллелограммов с одним и тем же периметром равным 120 см.

1) Параллелограмм со сторонами 15 и 45 см и острым углом в  $30^\circ$ .  $S = ah$ ,  $h = \frac{1}{2}a = 7,5$   
 $S = 45 \cdot 7,5 = 337,5 \text{ см}^2$ .

2) Ромб со стороной 30 см и острым углом в  $30^\circ$ .


$$S = ah = 30 \cdot 15 = 450 \text{ см}^2.$$

3) Прямоугольник со сторонами 20 и 40 см.

$$S = ab = 20 \cdot 40 = 800 \text{ см}^2.$$

4) Квадрат со стороной 30 см.


$$S = a^2 = 30^2 = 900 \text{ см}^2.$$



**Вывод:** из всех параллелограммов с одним и тем же периметром наибольшую площадь имеет квадрат.

4.4. Найдем также площади правильного 6-угольника, 8-угольника с периметром 120см и круга, длина окружности которого 120 см.





6-угольник  $a = R=20$   $S = \frac{R^2 3\sqrt{3}}{2} = \frac{20^2 \cdot 3\sqrt{3}}{2} = 1020 \text{ см}^2$

8-угольник со стороной 15см:

$$S = a^2 2(\sqrt{2} + 1) = 15^2 \cdot 2 \cdot 2,4 = 1080 \text{ см}^2$$

Круг, длина окружности 120см:

$$S = \pi r^2$$


$$l = 2\pi r \rightarrow 120 = 2\pi r \rightarrow r \approx 19$$

$$S = 3,14 \cdot 19^2 \approx 1133 \text{ см}^2.$$

**В результате моего исследования получилось:**

- наибольшую площадь имеют правильные фигуры, и чем больше количество сторон у этой фигуры, т.е. чем ближе она к кругу, тем площадь тоже больше;
- самой же большой площадью обладает круг, что подтверждает изопериметрическая задача.

Построим диаграмму по результатам исследования:



## 5. Применение изопериметрической задачи на практике

**Задача 1.** Рассекатель газовой горелки имеет форму круга диаметром 7 см. Рассчитать на сколько процентов увеличится расход газа, если круглый рассекатель заменить

-квадратным ;

-треугольным той же площади



Решение.

1. Для круглой формы

$$C = 2\pi r = 2 \cdot 3.14 \cdot 3,5 = 21,98 \text{ см.}$$

$$S = \pi r^2 = 38,465 \text{ см}^2$$

2. Для квадратной формы

$$a = \sqrt{S} = 6,2 \text{ см, } P = 6,2 \cdot 4 = 24,8 \text{ см;}$$

$$\frac{24,8 - 21,98}{21,98} = 13(\%)$$

3. Для формы правильного треугольника  $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ .  $a = \sqrt{\frac{4S}{\sqrt{3}}} = 9,5 \text{ см,}$

$$P = 9,5 \cdot 3 = 28,5 \text{ см;}$$

$$\frac{28,5 - 21,98}{21,98} = 30(\%)$$

Вывод: если форму рассекателя газовой горелки заменить с круглой на квадратную той же площади, то расход газа увеличится на 13%, а если на треугольную правильной формы- то увеличится на 30%.

**Задача 2** Почему канализационный люк круглый?



Практически все люки в городе прикрыты специальными крышками круглой формы.

Выясним, приведет ли изменение формы люка к изменению его стоимости.

Диаметр лаза люка в действующих стандартах близкий к 600 мм.

Практически все люки в городе прикрыты специальными крышками круглой формы.

Выясним, приведет ли изменение формы люка к изменению его стоимости.

Диаметр лаза люка в действующих стандартах близкий к 600 мм.

-при круглой форме длина окружности корпуса  $C = 2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 0,3 = 1,88$  м,

-при квадратной форме  $P = 4 \cdot 0,6 = 2,4$  м,

-площадь крышки круглой формы  $S = \pi r^2 = 0,28$  м<sup>2</sup>,

-площадь крышки квадратной формы  $S = a^2 = 0,36$  м<sup>2</sup>.

Таким образом перерасход материалов на производство люка при переходе от круглой к квадратной его форме составит  $\frac{0,36}{0,28} = 28$  %

Кроме того, квадратная крышка может провалиться в люк, чего никогда не случится с круглой крышкой.

**Задача3.** В Кузнецкой кузнице «Кузнец58» один погонный метр кованного забора стоит 3100 рублей. Определить наименьшую стоимость изгороди, если требуется оградить участок площадью 400 м<sup>2</sup>. Сравнить разные варианты.



Решение.

1. Наименьшая стоимость будет в том случае, если участок будет иметь форму круга.

$$S = \pi r^2. \quad r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} = \sqrt{\frac{400}{3,14}} = 11 \text{ м.} \quad C = 2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 11 = 69,08 \text{ м.}$$

Стоимость составит  $69,08 \cdot 3100 = 214148$  рублей.

2. Если ограда будет иметь форму квадрата, то сторона квадрата равна  $a = \sqrt{S} = 20$  м, периметр -  $20 \cdot 4 = 80$  м, стоимость  $80 \cdot 3100 = 248\ 000$  рублей.

3. Если ограда будет иметь форму прямоугольника со сторонами 25 м и 16 м, то его периметр 82 м, а стоимость  $82 \cdot 3100 = 254000$  рублей.

**Задача4.** Возвращаясь к задаче царицы Дидоны, рассчитаем территорию, которую заняла Дидона.



В интернете я нашел приблизительную площадь бычьей шкуры-35800 см<sup>2</sup>. Разрежем ее на полоски шириной 0,5 см, тогда длина полуокружности равна будет 71600 см или 716 м.

$$C=2\pi R, \quad \frac{C}{2} = \pi R,$$

$$R=716:3,14 \approx 228(\text{м})$$

$$S_{\text{круга}}=\pi R^2,$$


$$S_{\text{круга}}=3,14 \cdot 228^2 \approx 163230(\text{м}^2)$$

$$S_{\text{полукруга}} = S_{\text{круга}} : 2 = 81615(\text{м}^2)$$

На площади 81615 м<sup>2</sup> можно было даже построить крепость.

**Задача 5.** Можно ли в листе бумаги размером с обычную страницу из тетради проделать такое отверстие, чтобы сквозь него мог пройти человек?

Если лист бумаги разрезать так, что при растяжении данной модели в результате можно получить окружность.



## 6. Изопериметрическая задачи в пространстве

Изопериметрической теореме в пространстве мы склонны верить без математического доказательства.

Сама природа расположена в пользу шара. Дождевые капли, мыльные пузыри Солнце, Луна, наша Земля, планеты шарообразны или почти шарообразны.

Немного зная физику поверхностного натяжения, можно научиться изопериметрической теореме у мыльного пузыря. Будучи сжаты окружающей средой, они стремятся в силу сцепления образовать при неизменном объеме более толстую поверхностную пленку.

То же можно сказать про кота, который в холодную ночь сворачивается в клубочек и таким образом делает своё тело насколько возможно шарообразным. Пытаясь сохранить тепло, он уменьшает свою поверхность. Таким образом, он решает задачу о теле с данным объемом и наименьшей поверхностью.

Рассмотрев эту проблему, можно ответить на вопрос: почему нефтехранилища на крупных заводах всегда делаются цилиндрическими (а иногда даже шарообразными), а не в виде, скажем, куба, что технологически было бы гораздо удобнее?

*«Всё моё, моё!» — говорит жадный человек, собирая свои руки в круг, показывая, как много добра он может ими захватить. При этом не подозревая, что демонстрирует решение одной из самых древних задач математики — изопериметрической задачи.*

## Заключение

Итак, в своей работе для достижения цели мною были проведены эксперименты, решены задачи и обоснована изопериметрическая проблема: среди геометрических фигур на плоскости с равными периметрами наибольшую площадь имеет круг.

В дальнейшем я могу продолжить изучение данной задачи, исследовать пространственные фигуры и с помощью эксперимента показать, что из всех тел, ограниченных поверхностью данной величины, наибольший объем у шара.

Ежедневно в нашей жизни нам встречаются задачи на нахождение наибольших или наименьших значений, потому что разумный человек непременно ищет такой путь, который поможет ему достигнуть наибольшей выгоды. Но при этом мы даже и не подозреваем, что в таком простом бытовом случае мы решаем изопериметрические задачи.

Учитель мне сказала, что изопериметрические задачи также относят к классу так называемых «экстремальных задач». Обычно такие задачи изучаются в курсе алгебры и начал анализа и решаются с помощью производной (вот и я их буду в 11 классе решать!).

Задача же Дидоны- классическая экстремальная задача по геометрии.

## Литература и интернет-ресурсы

1. Крыжановский А.Б. «Изопериметры» М. - Л.,Физматлит, 1959 г.
2. Олехник С. Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. «Старинные занимательные задачи».- 2-е изд. исправленное,- Москва «Наука», 1988.
3. Перельман Я. И. «Живая математика». Москва «Наука», 1978 г.
4. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 5–7 кл. –М.: Просвещение, 2002.
5. Тихомиров В. М. Рассказы о максимумах и минимумах. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.
6. Шарыгин Д. Миф о Дидоне и изопериметрическая задача. «Квант» №1, 1997г.
7. Шарыгин И. Ф.Задачи по геометрии. Планиметрия. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1982.
8. <http://naukoved.ru>
9. <http://kvant.mccme.ru>
10. <http://goo.gl/PeqffB>
11. [http://philipok4.narod.ru/Tuser7/Starinnye\\_zadachi.pdf](http://philipok4.narod.ru/Tuser7/Starinnye_zadachi.pdf)

## Рецензия на научно-исследовательскую работу по математике

### Тема: «Изопериметрическая задача Дидоны»

Работу выполнил ученик 8 «б» класса Шалимов Николай. Исследовательская работа посвящена актуальной теме использования экстремальных задач, которые не только очень важны в математике и ее приложениях, но и красивы. Одной из таких задач является так называемая задача Дидоны. Цель работы четко сформулирована и обоснована. План исследования включает в себя все необходимые этапы для достижения цели.

Исследовательская работа имеет логически правильную структуру. Она состоит из введения, теоретической части, практической части, заключения, а также списка использованной при написании исследовательской работы литературы. Работа грамотно оформлена. Она содержит большое количество иллюстративного материала, что позволяет более наглядно раскрыть ее основные результаты.

Тема проекта полностью раскрыта. Николай демонстрирует знания, выходящие за рамки школьной программы. В реферативной части он раскрывает теоретические основы понятия изопериметрическая задача, историю задачи Дидоны, различные области применения. Обучающийся грамотно проанализировал большое количество литературы по заданной тематике. Теоретическая часть оформлена в соответствии с требованиями к реферативной работе и заслуживает высокой оценки.

Проект является исследовательским, поэтому способствует развитию познавательного интереса, аналитических способностей, различных способов восприятия и обработки информации.

В практической части Коля проводит собственное исследование ставит эксперименты и доказывает, что наибольшую площадь имеют правильные фигуры (и чем больше количество сторон у этой фигуры, тем площадь тоже больше), а самой же большой площадью обладает круг, что подтверждает изопериметрическая задача. Обобщив полученные результаты, приходит к выводу, что задача Дидоны имеет огромное применение в практической жизни и видит перспективу данной работы в изучении пространственных фигур.

На протяжении всего периода работы над проектом у ученика формировались необходимые предметные знания и умения, общеучебные умения и навыки, необходимые компетентности.

В результате работы над проектом была разработана презентация на тему «Изопериметрическая задача Дидоны». Продукт полностью соответствует требованиям качества, удобен в использовании, соответствует целям проекта.



Данную работу можно использовать в качестве дидактического материала для внеклассной работы: факультатив, кружковая работа.

Таким образом, можно заключить, что поставленные цели и задачи успешно решены.

В целом работа заслуживает отличной оценки. Работу можно рекомендовать к участию во III открытом региональном конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж-Пенза»2021

Дата: 9.01.20

Рецензент: учитель математики МБОУ СОШ №3 г. Кузнецка

Сергеева Елена Владимировна

